



PÁJAROS NUEVOS CHILENOS



La descripción de estos pájaros debía venir acompañada de figuras en una de las entregas del Museo Nacional junta con la descripción de los pájaros nuevos descritos por mí anteriormente i con las figuras de éstos, pero en vista de la demora en la publicación de los Anales del Museo i de mi edad avanzada, he juzgado conveniente publicarlas desde luego.

Son especies de los tres jéneros *Elainea*, (*Myiobius*), *Synallaxis* i *Chrysomitris*.

ELAINEA Sundewall, 1835.—MYIOBIUS Gray, 1840

(Gay, Zool. I, p. 340)

Hasta ahora se conocía solo una especie de este jénero en Chile; puedo agregar una segunda, pero estoy perplejo a cuál de los jéneros o subjéneros deba referirse, en que el jénero *Elainea* ha sido subdividido. Doi la lista de los sinónimos segun el Thesaurus Ornithologiæ de Giebel, t. II, p. 79, pero poniéndolos en órden alfabético.

Anomalopterus Schiff.	Myiobius Gray.
Camptostoma Sclat.	Myiophanistes Reichb.
Capsiempis Cab.	Myiozetes Schiff.
Conopias Cab.	Myiozetetes Sclat.
Elaenia Gray.	Ornithion Hartl.
Elaenia Cab.	Paroides Less.
Empidagra Cab.	Phyllomyias Cab.
Eupsilostoma Sclat.	Pipromorpha Schiff.
Legatus Sclat.	Rhamphotrygon Bonap.
Leptopogon Cab.	Sublegatus Sclat.
Mechætornis Reichb.	Tyranniscus Cab.
Mionectes Cab.	Tyrannula Burm.
Muscicapa d'Orb.	Tyrannulus Vieill.

El *Myiobius albiceps* Gray (Gay. l. c.) debe llamarse *Elainea pagana* (Muscicapa) Licht.

ELAINEA MURINA.—Ph.

Toda la parte superior es de un gris oscuro, que tira al color ceniza en la cabeza i en el cuello, i que es lavado de canela en la parte superior del dorso, sin traza de mancha blanca cervical; párpados blancos; la rejion de la oreja es casi negra; el ápice de las cubiertas alares superiores bordado de color canela; no hai ninguna traza de fajas blancas en las alas; el borde exterior de los remijios es gris oscuro lavado de canela, el interior color ceniza; cola escotada, la parte inferior del cuello, el pecho, i los costados son de color ceniza, el vientre de un blanco ceniciento, que tira a moreno en la parte inferior; las cubiertas inferiores de la cola son de un blanco que tira a ceniciento.—El pico es un poquito mas corto que el de la *E. pagana* (*Myiobius albiceps*) i de color de cuerno, los piés de un pardo oscuro.

Dimensiones. Lonjitud del cuerpo 82 milímetros, del ala 68 milímetros, de la cola 35 milímetros, del pico 10 milímetros, del tarso 17 milímetros.

El Museo posee un solo ejemplar, macho adulto, cazado en Mayo 1854 en la provincia de Santiago.

Esta avecilla se distingue de la *Elainea pagana*, nuestro *Vio*

o *Pío*, no solamente por el color, la falta de las dos fajas blancas de las alas i la cola escotada sino tambien por las dimensiones, siendo que las alas, i sobre todo la cola de la *E. murina* son mucho mas cortas en proporcion.

	<u>E. pagana de Chile</u>	<u>E. pagana de Buenos Aires</u>	<u>E. murina</u>
longitud total hasta la punta de la cola.....	132 mm.	153	123
ala.....	80	80	68
cola.....	77	78	35

SYNALLAXIS Vieill.

El jénero tiene los siguientes sinónimos:

Anabates Temm.	Malacurus Reichb.
Anabacerthia Lafr.	Malanoparcia Reichb.
Anumbium d'Orb.	Oxyura Swains.
Asthenes Reichb.	Parulus Spix.
Bathmicercus Fitz.	Phacellodomus Reichb.
Bathmidura Reichb.	Phloeocryptes Cab.
Certhiaxis Less.	Schizura Cab.
Coryphistera Burm.	Sibtornis
Leptasthenura Reichb.	Sphenopya Cab.
Leptoxyura Reichb.	Sylviorthorrhynchus Gay.

Han ingresado últimamente en el Museo tres pajarillos, que debo colocar en el jénero de Synallaxis de Vieillot, pues confieso que me hallo embarazado para colocarlos debidamente en uno de los muchos jéneros en que ha sido dividido por los modernos, a escepcion del primero, que pertenece seguramente a la *Leptasthenura*.

SYNALLAXIS (PHLOEOCRYPTES) MELANOPS (Vieill?)

Gay, Sclater, Taczanowski ct.

Esta avecilla que se encuentra en Chile, la República Argentina, Patagonia i en el Perú segun Taczanowski, está figu-

rado en el "Voyage dans l'Amerique meridionale" de D'Orbigny bajo el nombre de *Synallaxis dorsomaculata* (lám. 14 fig. 1.) Taczanowski en su "Ornithologie du Pérou", t. II p. 116 copia la diagnosis latina de D'Orbigny, dice p. 117. "Nuestro pájaro del Perú central conviene perfectamente con la descripción i figura de D'Orbigny, pero los colores rojizos son mas vivos en la figura citada, sobre todo los de la cola; en nuestros pájaros peruanos las dimensiones son mucho mas fuertes; las de D'Orbigny son las siguientes: lonjitud total 127 milímetros; del ala 55 milímetros, de la cola 30(1) del pico 13 milímetros." Taczanowski indica las dimensiones siguientes del macho: lonjitud del ala 63 milímetros, de la cola 57 milímetros, del pico 18 milímetros. No dice nada de la lonjitud total; la *cola seria en proporcion mucho mas larga*, lo que es una diferencia mui notable; probablemente específica.

El pájaro chileno que, hemos tomado por la *S. menalops* difiere en varios puntos del arjentino figurado por D'Orbigny. Tengo varios ejemplares delante de mí. La lonjitud total del cuerpo es solo de 11.5 centímetros, la del ala 53 centímetros, de la cola 42 milímetros, del pico 15-16 milímetros. Los individuos chilenos son, pues, mas pequeños, que el de D'Orbigny, i éste tiene la cola notablemente mas corta, 35 milímetros, en los nuestros mide 42 milímetros, en los de Taczanowski 57 milímetros, casi el doble! ¿Será error del pintor de D'Orbigny? Segun D'Orbigny la cabeza i la nuca son negruzcas estriadas de un rojizo pardo por los bordes laterales largos de todas las plumas; en el pájaro chileno no hai nada de negruzco en estas partes, son de un pardo rojizo, i muestran, miradas con lente, líneas finas *blancas*, que son los cañones de la pluma. D'Orbigny dice: "el cuello está ocupado de un semi-anillo rojizo", i nuestros ejemplares tienen pescuezo i pecho de un blanco puro. En el ave peruana "el ovispillo i las escupulares son de un rojizo vivo", en la chilena son del color pardo rojizo jeneral. La cola es segun D'Orbigny "negra con las cuatro rectrices esteriore terminados de rojizo, i las dos medianas de un rojo moreno con una larga raya mediana negra en su mitad terminal."

(1) En la figura, 35 mm.

No hai la menor traza de esta raya negra en las rectrices medianas, que son de un moreno rojizo bastante claro, i el borde de la estremidad de las rectrices exteriores es angosto i blanquizco. D'Orbigny no dice nada de la forma de la estremidad de estas plumas, pero da una figura de la cola, segun la cual las plumas terminarian simplemente en punta, mientras en el ave chilena el cañon se prolonga mas allá de las barbas en forma de cerda por el largo de 4 i hasta 5 milímetros.

Comparemos ahora nuestra ave con la descripción que Scater da de la *S. melanops* en su *Argentine Ornithology* t. I, p. 174. Dice: frente morena, corona (vértice) *negruzca*, cola *negruzca*, las dos plumas medianas de un gris morenusco; (en la ave chilena son de un moreno rojizo); como se ve no hai tampoco en el ave arjentina las rayas negras de las rectrices medianas, que caracterizan, segun D'Orbigny, el *Synallaxis dorsomaculata*.

Scater no dice tampoco nada de la forma de la estremidad de las rectrices! Sus dimensiones son las siguientes: lonjitud total 5.8 pulg. = 145 milímetros, del ala 58 milímetros, de la cola 40 milímetros. No da la medida del pico.

Pongo ahora las dimensiones juntas de estos cuatro pájaros.

	D'Orbigny	Taczanowski	Scater	Philippi
Lonjitud total.....	127 mm.	—	145	115
" del ala.....	53	63	58	58
" de la cola.....	35	57	40	42
" del pico.....	13	18	—	15-16

Parece increíble, que las dimensiones puedan variar tanto en la misma especie. ¿Son erróneas algunas mensuras? ¿Conveniria establecer varias especies?

Examinemos ahora si la *Synallaxis dorsomaculata* es bien la *Sylvia melanops* de Vieill, como se pretende jeneralmente.

SYLVIA MELANOPS Vieill.

Nouveau Dict. d'Histoire nat. tome XI p. 232. Encyclop. Meth. p. 434 "se trouve au *Paraguay*. Elle a cinq pouces et demi (= 152 mm.) de longueur; l'œil noir; le bec noirâtre; le

tarse de couleur de plomb; le derrière de la tête, le bas du dos, le croupion et toutes les parties inférieures d'un roux faillé; une bande de la même couleur, qui part des narines passe au-dessus des yeux et se termine à la nuque; une tache noirâtre couvre la paupière inférieure et l'oreille; les plumes du dessus du cou et du haut du dos sont blanches sur la tige, noires à l'intérieur et d'un plomb clair en dehors; les petites couvertures des parties internes de l'aile d'un brun roussâtre; les grandes des mêmes parties d'un rouge de carmin à leur origine et leur bout, et noires sur le milieu; les autres couvertures brunes; les plumes secondaires d'un brun noirâtre dans une moitié, d'un rouge de carmin dans l'autre; cette teinte s'étend encore sur le milieu des plumes primaires, qui dans le reste sont d'un brun foncé; la queue a sa plume extérieure, de chaque côté, d'un roux sombre, le reste noir; le tarse est d'un couleur de plomb et le bec noirâtre.»

No necesito ya demostrar, que los caracteres impresos con letras itálicas no convienen de ninguna manera ni a la *Synallaxis* del Perú, ni a la de Chile o de la Argentina, i me siento inclinado a creer, que la *Sylvia melanops* del Vieillot no es ni siquiera una *Synallaxis*. En primer lugar la *Sylvia melanops* es del Paraguai, i Sclater i Taczanowski omiten en la indicacion de la patria de la *S. melanops* el Paraguai. En segundo lugar me llama la atención, que Vieillot, el autor del jénero *Synallaxis* no ha incluido en este su *Sylvia melanops*.

Sea de todo esto lo que fuera es evidente lo siguiente:

1.º La *Synallaxis melanops* de los autores, v. gr. de Sclater, Taczanowski?, Desmurs en Gay, no es la *Sylvia melanops* de Vieillot, i debe llamarse *Synallaxis dorsomaculata*.

2.º La *Synallaxis melanops* del Perú de Taczanowski, sobre todo la que ha hallado en las inmensas alturas del lago de Titicaca, es probablemente una especie distinta.

3.º La *Sylvia melanops* verdadera de Vieillot del Paraguai parece haber quedado desconocida a los ornitólogos, modernos i es dudoso si pertenece realmente al jénero *Synallaxis*.

SYNALLAXIS MELANOPS VAR?

an nova species SYNALLAXIS MONTANA dicenda?

Cabeza en dos ejemplares de color negruzco como toda la parte superior del ave, en uno la frente tira al moreno rojizo; los cañoncitos de las plumas de la cabeza tan negruzcas como las barbas. La faja superciliar blanca, llega hasta el pico; debajo de ella i detras del ojo una mancha negra. La parte superior del dorso negra, adornada de líneas blancas, que son el borde exterior de las plumas; la parte inferior con los lados negra. Alas negras, con una mancha de un canelo vivo de la mitad basilar de las remijias primera, segunda, tercera i cuarta, cuya barba exterior es de este color; otra mancha rojiza, ménos o poco aparente en las cubiertas de las remijias; cola enteramente negruzca (aun las dos rectrices del medio) en dos ejemplares, en otro ejemplar estas dos plumas son morenas, i este es el que tiene la frente morenuzca, las otras rectrices tienen la punta mas bien gris que morenuzca. Garganta, pecho, abdómen de un blanco puro; las cubiertas inferiores de la cola son de un blanco sucio, que tira a gris o a moreno. Pico *negro* con la base, sobre todo de la mandíbula inferior color de cuerno; patas de un color de cuerno oscuro.

Dimensiones

Núm. 1 Lonjitud del cuerpo 93 mm., del ala 58 mm., de la cola 45 mm., del pico 16 mm.

Núm. 2 Lonjitud del cuerpo 92 mm., del ala 57 mm., de la cola ?, del pico 16 mm.

Núm. 3 Lonjitud del cuerpo 94 mm., del ala 60 mm., de la cola 41 mm., del pico 17 mm.

SYNALLAXIS (LEPTASTENURA) STENOPTILA.—Ph.

S. supra omnino nigro-cinerea, capite albo striato; gutture al-bido, pectore abdomineque fere murino cinereis, lateribus colli

albi nigro maculatis; remigiarum dimidio basali rufo; rectricibus medianis (maris prælongarum) medio inde usque ad apicem attenuatis; rostro parvo pedibusque nigris.

Longit. corporis 78 mm., caudæ ♂: 81 mm., ♀ 55 mm., rostri 7 mm.

Habitat in Andibus provinciæ Santiago.

Hemos recibido en la primavera un par, que casi habia concluido la muda de las plumas. Toda la parte superior del pájaro es de un negro uniforme, que tira a gris, pero en la cabeza i la nuca se ven estrías blancas; los lados de la cabeza son de color gris, que pasa insensiblemente al color blanquizco de la garganta, no hai faja supraorbital blanca. Los dos lados del cuello son blanquicos i adornados de manchitas longitudinales negras. El pecho es de un blanco sucio, que tira a gris, i pasa al gris sucio del abdómen. El uropijio i la cubierta de las plumas de la cola son grises.

El mismo color tienen las remijias, pero la segunda, tercera, cuarta, quinta i sexta tienen la mitad basal de la barba exterior de un hermoso color de canela. Las rectrices son mui particulares, mui desiguales en longitud i las medianas del macho adelgazadas desde la mitad de su longitud en una punta mui afilada, las siguientes son cortamente adelgazadas, i todas tienen la barba exterior tan angosta, que parece faltar; las exteriores son de un gris claro, las medianas casi negras. El pico, que es mui corto, i las patas son negras.

La hembra tiene la cola mucho mas corta, con plumas ménos afiladas.

SYNALLAXIS CINEREA.—Ph.

Cabeza i toda la parte superior del cuerpo color de ceniza; con visos color de canela en las cubiertas alares; una faja superciliar angosta blanquizca; garganta blanquizca con manchas negras; pecho gris, abdómen de un gris tirando mas o ménos a rojizo; cubiertas inferiores de la cola del mismo color; remijias de un solo color, sin faja color canela; rectrices bien negras en la cara inferior; redondeada en la punta, sin ser prolongadas en una punta. Pico i piés negros.

Habitat in Andibus provinciæ San Fernando.

Hemos recibido dos ejemplares; el uno es de un color de ceniza puro; en el otro el color gris tiene un ligero viso moreno. Ninguna pluma tiene sus bordes de otro color salvo las cubiertas claras, que son morenas rojizas en la articulacion de la mano. Las dos plumas exteriores de las cubiertas inferiores de la cola tiene la barba exterior blanquizca o morenuzca.

Dimensiones

Lonjitud del cuerpo 95 mm., del ala 60 mm., de la cola 53 mm., del pico 15 mm.

La muda de las plumas no está concluida enteramente.

Chrysomitris Boie.

CHRYSOMITRIS ANTHRACINA.—Ph.

Chr. omnino atra, etiam pectore et ventre; fascia angusta remigium, reatricibus lateralibus, et tectricibus inferioribus caudæ laete luteis (citrinis) reatricibus medianis omnino atris.

In Andibus provinciæ San Fernando reperta.

Esta especie es sumamente parecida a la *Chr. atrata* (D. Orb. i Laf.) pero mui distinta por tener toda la parte inferior del cuerpo, ménos las cubiertas de la cola, del mismo color negro de carbon como la parte superior. La primera remijia es negra con el borde de la mitad basal blanquizco, la segunda, tercera, cuarta, quinta i sexta tienen la mitad basal de un hermoso amarillo de limon; en las siguientes, la porcion amarilla es mas corta; las tres plumas exteriores de la cola tienen la barba exterior de mitad basal del mismo color amarillo. Las cubiertas inferiores de la cola son igualmente amarillas, pero de un matiz mas pálido. Las remijias son por debajo en su mitad inferior de un amarillo algo pálido, por lo demas negruzcas, la primera tiene todo el borde exterior negro. El pico es casi blanquizco, las patas negruzcas.

Dimensiones

Lonjitud del cuerpo 130 mm., del ala 75 mm., de la cola 50 mm.

